

Náklady na adjuvantnú chemoterapiu kolorektálneho karcinómu na Slovensku

Veronika Dubajová¹, Adela Lagin¹, Viliam Foltán¹, Milan Dubaj², Ľubica Piešacká³

¹Farmaceutická fakulta, Univerita Komenského, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, ²Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 949 01 Nitra, ³Infektologická klinika, Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 949 01 Nitra

dubajova@fpharm.uniba.sk

Cieľ: Cieľom práce je vyhodnotenie farmakoeconomických aspektov adjuvantnej terapie kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Metodika: Využili sme metódu porovnávania priamych medicínskych, priamych nemedicínskych nákladov a nepriamych nákladov počas podávania chemoterapie s fluorouracilom alebo s kapecitabínom u modelového pacienta s kolorektálnym karcinómom.

Výsledky: Priame medicínske náklady na chemoterapiu pozostávajú z nákladov na lieky, zo zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení a z nákladov na výkony poskytované pri zdravotnej starostlivosti. Tieto náklady pri fluorouracile sú 2642,51/2586,75 eur v závislosti od použitých zobrazovacích vyšetrení a pri použití kapecitabínu náklady predstavujú až 4156,83/4101,07eur v závislosti od použitých zobrazovacích vyšetrení, pričom rozdiel je až približne 1500 eur. Priame nemedicínske náklady a nepriame náklady počas podávania chemoterapie s fluorouracilom alebo s kapecitabínom u ambulatne riešeného pacienta sú rovnaké a predstavujú 33,81 eur. Hospitalizácia a s tým súvisiace priame nemedicínske a nepriame náklady sú charakteristické najmä pri podávaní fluorouracilu a šplhajú sa za k sume 2187,70 eur. Celkové náklady na terapiu pacienta liečeného s fluorouracilom sú 2676,32/2620,56 eur a pacienta liečeného s kapecitabínom 4190,64/4134,88 eur, pokiaľ ide o ambulatnú zdravotnú starostlivosť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojenej s hospitalizáciou je hlavne v prípade liečby s fluorouracilom a celkové náklady sú 4830,21/4774,45 eur.

Záver: Onkologická liečba patrí medzi najnákladnejšie terapie a zdravotné poisťovne vkladajú veľkú časť svojich financií práve do tejto oblasti. Možno aj vďaka tomu môžeme povedať, že v terapiách kolorektálneho karcinómu je viac preferovaný menej toxický kapecitabín oproti ale lacnejšiemu fluorouracilu.